

Số: 37/TB-UBND

Xuân Huy, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Tình hình sinh vật gây hại và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại trên lúa vụ Chiêm Xuân năm 2024

I/ TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI:

Hiện nay, các trà lúa chiêm xuân đang giai đoạn làm đòng đến trổ bông, những ngày qua, thời tiết âm u có lúc có mưa đây là giai đoạn cây lúa rất mẫn cảm với các đối tượng sâu, bệnh hại. Đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh phát sinh phát triển và gây hại. Qua thăm đồng cho thấy hiện nay trên đồng ruộng một số đối tượng sâu, bệnh đang phát sinh, phát triển mạnh, có nguy cơ gây hại nặng trong thời gian tới, gây ảnh hưởng tới năng suất lúa vụ Chiêm Xuân cụ thể như sau:

1. Rầy các loại: Hiện tại rầy tập trung gây hại trên lúa trà 1 giai đoạn đòng già đến trổ bông ở hầu hết các khu, mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng ở các xứ đồng của khu 1.

* **Dự báo:** Rầy trưởng thành tiếp tục đẻ trứng với mật độ cao trong vài ngày tới, và gây hại trên lúa giai đoạn phơi màu đến ngậm sữa; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ở nặng đến rất nặng có thể gây cháy ổ, cháy chòm sau 30/4 nếu không được phòng trừ kịp thời.

2. Bệnh đạo ôn: Hiện tại nguồn bệnh đạo ôn lá đã có sẵn trên đồng ruộng. Trong điều kiện thời tiết đêm và sáng có mưa sương, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh tiếp tục phát triển và gây hại trên cổ bông, cổ gié; mức độ gây hại nhẹ, cục bộ ở trung bình. Cần chú ý một số giống mẫn cảm như: J02, TBR225, Hương thơm 1,...

3. Bệnh khô vằn: Hiện tại bệnh gây hại trên các trà lúa ở hầu hết các khu. Trong thời gian tới bệnh tiếp tục phát triển, lây lan, gây hại bộ lá đòng; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên những diện tích lúa xanh tốt, rậm rạp, ruộng bón phân không cân đối.

4. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Thời tiết chuyển mùa thường sẽ có mưa rào kèm dông lốc, bệnh sẽ phát sinh gây hại bộ lá đòng, bệnh phát sinh và gây hại trên giống lúa Tẻ Nương của khu 5, các giống lúa bản lá to, mềm.

II/ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1/ Rầy các loại: Khi ruộng có mật độ rầy tuổi 1,2 trên 1000 con/m² (25 con/khóm), cần phun phòng trừ bằng một trong các loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sử dụng ở Việt Nam như: Florid 700 WP, Actara 25WG, Comda gold 5WG, Chersieu 75 WG, Nibas 50 EC,.... (*Lưu ý: Với những ruộng có mật độ rầy cao như ở khu 1 cần phun ngay, sau khi phun cần kiểm tra và phun nhắc lại lần 2 sau 3-4 ngày để đảm bảo hiệu quả*).

2/ Bệnh khô vằn: Khi ruộng có tỷ lệ danh hại trên 20% tiến hành phun phòng trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục thuốc BVTV như : Chevin 5SC, Lervil 50SC, Ca vil 60WP....., ruộng bị hại nặng cần phun kép 2 lần cách nhau từ 5-7 ngày.

3/ Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Một số ruộng bị bệnh bạc lá cần phun phòng trừ ngay như lúa Tẻ nương của khu 5, phun trừ ngay bằng các thuốc đã đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng như : starwiner 20 WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20 WP....., ruộng bị hại nặng cần phun kép 2 lần cách nhau từ 5-7 ngày.

4/ Bệnh đạo ôn: Trên những diện tích lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá gây hại, cần phun phòng trừ đạo ôn cổ bông khi lúa thấp thoi trở bằng các loại thuốc có trong danh mục như: Fu-army 30WP; Katana 20SC; Funhat 40WP, Sieubem 777WP; ...), pha và phun theo hướng dẫn kỹ thuật trên bao bì.

Lưu ý: Có thể phun phòng trừ bệnh bạc lá, khô vằn, đạo ôn, rầy kết hợp. Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương.

Thời gian từ nay đến cuối vụ là thời điểm quan trọng cần tập trung chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại. Nếu không phòng trừ sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Chiêm Xuân năm 2024. Trên đây là thông báo về tình hình sinh vật gây hại. Đề nghị các trưởng khu dân cư, đài truyền thanh thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của khu, của xã để nhân dân được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, UBND xã;
- Thành viên BCĐSX;
- Đài truyền thanh;
- Các trưởng khu dân cư;
- Lưu KN- VP.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Trọng Vĩnh**

