

Số: 38 /TB-UBND

Xuân Huy, ngày 02 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại trên lúa, biện pháp phòng trừ và cách khắc phục cây lúa bị đổ sau mưa bão

Trong tuần qua một số đội tượng sâu, bệnh hại phát triển mạnh và gia tăng gây hại trên lúa giai đoạn trổ bông đến ngâm sữa, chắc xanh. Theo kết quả điều tra sâu bệnh ngày 28-29/4 của tổ khuyến nông, cán bộ BVTV, ban chỉ đạo sản xuất xã thông báo tình hình sâu, bệnh hại cụ thể như sau:

1. Rầy các loại: Rầy cám lúa 2 đã nở rộ và gây hại trên cả hai trà lúa (tập trung gây hại mạnh nhất ở khu 1 và những ruộng lúa bị đổ rải rác ở các khu 2,3,5,6). Mật độ rầy phổ biến 120-400 con/m², cao 1000-1600 con/m², phát dục chủ yếu rầy tuổi 1,2,3.

Trên những diện tích đã được phun phòng trừ hiệu quả, hiện tại mật độ rầy thấp, gây hại nhẹ. Tuy nhiên một số diện tích nhiễm chưa phun thuốc hoặc phun nhưng mật độ quá cao không phun kếp lại lần 2 và những diện tích của trà 2, hiện tại rầy gây hại mức độ trung bình đến nặng nguy cơ gây cháy chòm, cháy ổ trong thời gian tới nếu không được phòng trừ triệt để.

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Do điều kiện thời tiết có mưa bão, giông lốc, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại rải rác ở hầu hết khắp các xứ đồng của các khu, mức độ gây hại nhẹ, cục bộ ổ trung bình như ở khu 5, khu 6.

* **Dự báo:** Trong thời gian tới bệnh tiếp tục phát triển và gây hại bộ lá đồng, nhất là trong điều kiện có xen kẽ mưa rào; mức độ gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng như ở khu 5, khu 6 nếu không được phòng trừ kịp thời.

3. Bệnh khô vằn: Các diện tích nhiễm bệnh đã được nhân dân phun thuốc phòng trừ hiệu quả. Tuy nhiên trong thời gian tới, bệnh tiếp tục phát triển, lây lan và gây hại bộ lá đồng nhất là trong điều kiện nắng mưa đan xen, tập trung chủ yếu trên diện tích lúa trà 2, nhất là trên diện tích lúa xanh tốt, rậm rạp, ruộng bón nhiều phân đạm; mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng nếu không được phòng trừ triệt để.

I. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KỸ THUẬT PHÒNG TRỪ:

1. Rầy các loại: Khi ruộng có mật độ rầy tuổi 1,2 trên 1000 con/m² (25 con/ 1 khóm lúa) giai đoạn sau trổ bông, cần phun phòng trừ bằng một trong các loại thuốc như: Florid 700 WP, Actara 25WG, Comda gold 5WG, Chersieu 75 WG, Nibas 50 EC.... Ruộng bị rầy hại nặng sau khi phun thuốc cần kiểm tra lại nếu mật độ rầy vẫn còn cao phải phun lại lần 2 sau 3-4 ngày. **(Lưu ý: Rầy đang gây hại mạnh ở khu 1 tuy đã được phun lần 1 nhưng mật độ rầy cao, kết hợp cây lúa bị đổ tạo điều kiện cho rầy phát triển nên cần khi phun nhắc lại lần 2 sau 3-4 ngày, thuốc trừ rầy cần phun đủ từ 1,5 - 2 bình 18-20 lít nước, thuốc cho 1 sào mới đảm bảo hiệu quả diệt trừ rầy).**

2. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Khi phát hiện ruộng bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng (ví dụ như Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Kasumin 2SL, Totan 200WP, Avalon 8WP...). Ruộng bị hại nặng cần phun kép 2 lần cách nhau từ 5-7 ngày. **Lưu ý: Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn đang lây lan và phát triển mạnh ở khu 5, khu 6 đề nghị trưởng khu thông báo cho nhân dân phun ngay bằng các loại thuốc ở trên.**

3. Bệnh khô vằn: Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ đánh hại trên 20%, tiến hành phun phòng trừ bằng một trong các loại thuốc, ví dụ: Chevin 5SC, Cavil 60WP, Nativo 750WG, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Valivithaco 5SL,... Ruộng bị hại nặng cần phun kép 2 lần cách nhau từ 5-7 ngày.

Lưu ý: Có thể phun phòng trừ bệnh bạc lá, khô vằn, rầy kết hợp. Khi sử dụng thuốc BVTV xong phải thu gom vỏ bao bì đúng nơi quy định của địa phương.

II. CÁCH KHẮC PHỤC CHO CÂY LÚA BỊ ĐỔ SAU MƯA BÃO

1. Đối với diện tích lúa mới trổ: Thì cây lúa có khả năng góc lên được thì không cần phải dựng.

2. Đối với những diện tích lúa đang giai đoạn ngân sữa, chắc xanh: Yêu cầu tháo cạn nước trong ruộng và tiến hành dựng lúa bằng cách túm từ 3 đến 5 gốc lúa lại với nhau theo chiều nghiêng của cây lúa. Tuyệt đối không được dựng ngược cây lúa về phía sau sẽ làm gãy gốc lúa. Khi lúa bị đổ thì nguy cơ bị nhiễm các loại sâu bệnh nhất là rầy nâu, khô vằn.

3. Đối với những diện tích lúa đã đổ đúi: Bà con cần khẩn trương huy động lực lượng để khơi thông dòng chảy, tiêu nước cho ruộng lúa, không để bông

lúa bị ngâm nước lâu nhằm hạn chế hiện tượng bị mọc mầm và các nấm bệnh gây hại như lem lép hạt hoặc khô vằn.

Thời gian từ nay đến cuối vụ là thời điểm quan trọng cần tập trung chỉ đạo phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại. Nếu không phòng trừ sẽ làm ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Chiêm Xuân năm 2024. Trên đây là thông báo về tình hình sinh vật gây hại, biện pháp phòng trừ và cách khắc phục cây lúa bị đổ sau mưa bão. Đề nghị các trưởng khu dân cư, đài truyền thanh thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của khu, của xã để nhân dân được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, UBND xã;
- Thành viên BCĐSX;
- Đài truyền thanh;
- Các trưởng khu dân cư;
- Lưu KN- VP.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Trọng Vĩnh**